

# AMOXYVET<sub>o</sub> - 50S

Contiene por gramo de polvo: 500 mg amoxicilina base equivalente a 573 mg de trihidrato de amoxicilina - polvo soluble



## AMPLIO ESPECTRO

La amoxicilina tiene un espectro más amplio y actúa más rápido que otras penicilinas.

## BUENA DISTRIBUCIÓN EN TEJIDOS

Buena distribución en pulmones y músculos. Las más altas concentraciones se encuentran en riñón, hígado y el tracto gastro intestinal.

## RÁPIDA REABSORCIÓN

Luego de la administración oral, la amoxicilina es mejor reabsorbida que la ampilina y se obtienen altos niveles s ricos más rápido

## INDICACIONES

Infecciones causadas por micro organismos susceptibles a la amoxicilina en terneros, aves y cerdos particularmente.

Terneros y ovejas:

- Infecciones del tracto respiratorio causadas por Pasteurella sp. y Salmonella dublin.
- Infecciones del tracto gastrointestinal causadas por E. coli, Clostridium.
- Infecciones causadas por Salmonella dublin.

Cerdos:

- Infecciones del tracto espiratorio causadas por Pasteurella multocida (A), Actinobacillus pleuropneumoniae y Streptococcus suis tipo II.
- infecciones del tracto gastrointestinal causadas by Fusobacterium necrophorum (mejillas costosas en lechones), Clostridium perfringens, Salmonella cholerae -suis y E. coli.
- infecciones del tracto urogenital causadas by E. coli, Corynebacterium suis y Erysipelothrix rhusiopathiae.
- Dermatitis causadas por Streptococcus sp., Staphylococcus hyicus y Staphylococcus pyogenes.

Aves:

- infecciones del tracto respiratorio (E. coli, Haemophilus sp., Pasteurella sp. y Salmonella sp.)
- infecciones del tracto gastrointestinal (Clostridium perfringens y Salmonella sp.)

## DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Administración oral en el agua de bebida, pienso o reemplazador de leche.

Cerdos, terneros:

La dosis general es 20-40 mg de amoxicilina por kg de peso vivo, dada en dos tomas (e.g. 1-2 gr AMOXYVETo-50S por 50 kg de peso vivo, dos veces al día) 37.5 – 75 gr de AMOXYVETo-50S por 100 litros de agua de bebida ó 75 - 150 gr de AMOXYVETo-50 S por 100 kg de pienso por 3 a 5 días consecutivos.

Aves:

La dosis general es de 10 mg de amoxicilina por kg de peso vivo por día.

10 ge de AMOXYVETo-50S por 100 litros de agua de bebida ó 20 gr de AMOXYVETo-50S por 100 kg de pienso, durante 3 a 5 días consecutivos. Doble la dosis si es necesario.

El agua medicada (< 25° C) debe cambiarse cada 12 horas. La leche medicada se debe consumir inmediatamente.

BACTERIAS GRAM-POSITIVAS		BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS			NAKED CELLS
Staphylococcus aureus (b-lactamase -)	Corynebacterium pyogenes Clostridium spp.	E. coli Salmonelai	Pasteurella	Bordetella avium	Mycoplasma spp.
SENSITIVO	SENSITIVO	MODERADO	SENSITIVO	SENSITIVO	RESISTENTE

**VMD**

S.A. V.M.D. N.V.

WE DO IT FOR THE BEAST

Hoge Mauw 900 - B-2370 Arendonk - Belgium • Tel. +32 (0)14 67 20 51 - Fax +32 (0)14 67 21 52

E-mail: vmd@vmdvet.be - Website: www.vmdvet.com

